


# PKU Anamix Infant

Modersmjölksersättning utan fenylalanin  
avsedd för kostbehandling av fenylketonuri (PKU)  
med LCP och prebiotika



# PKU Anamix Infant

PKU Anamix Infant är en modersmjölksersättning utan fenylalanin avsedd för kostbehandling av fenylketonuri (PKU) hos spädbarn 0–1 år. Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, fett, vitaminer, mineraler och spårämnen. Den är kompletterad med LCP (långkedjiga fettsyror), arakidonsyra (AA) och dokosaheksaensyra (DHA) i nivåer som motsvarar bröstmjölkens. Dessutom innehåller PKU Anamix Infant en unik prebiotikablandning av GOS/FOS (galakto- och fruktooligosackarider). PKU Anamix Infant måste kompletteras med naturligt protein, t.ex. från bröstmjolk, för att täcka behovet av fenylalanin.

## PKU Anamix Infant per 100 ml vid en spädning på 15 g/100 ml

- 70 kcal
- 3,5 g fett från solros-, soja-, kokos-, raps- och encellig olja med hög halt AA och DHA (44 E%)
- 7,5 g kolhydrat från glukossirap (43 E%)
- 0,56 g kostfiber (2 E%)
- 2 g proteinekvalenter (11 E%)

## ANVÄNDNING

PKU Anamix Infant används under inrådan av dietist eller läkare som modersmjölksersättning i behandlingen av fenylketonuri (PKU) till spädbarn 0–1 år. Lämplig som komplement till övrig kost för barn 1–3 år.

## TILLREDNING

**Spädning:** Använd alltid skopan som finns med i burken för rätt dosering. För varje skopa (5 g) tillsätts 30 ml vatten för att uppnå rekommenderad koncentration (15%). Initialt kan en lägre koncentration krävas för att säkerställa fullgod acceptans. Modersmjölksersättning i pulverform är inte steril. PKU Anamix Junior skall därför tillredas strax innan matningstillfället och inte varmhållas längre än 15 minuter före användning. Överbliven näring kastas.

1. För att undvika kontamination, tvätta händerna och använd alltid väl rengjorda hushållsredskap.
2. Koka upp vatten (använd aldrig varmt vatten direkt från kranen). När det gäller äldre barn behöver vattnet som regel inte kokas om vattenkvaliteten är god, men pulvret löser sig bäst i varmt vatten.
3. Låt vattnet svalna några minuter och mät upp avsedd mängd vatten i en nappflaska/behållare.
4. Tillsätt rekommenderat antal skopor pulver till vattnet.
5. Vispa eller skaka kraftigt tills pulvret löst sig.
6. Kontrollera blandningens temperatur genom att droppa PKU Anamix Infant på insidan av din handled.

## DOSERING

Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare.

## FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst-före datum anges på burkens botten som dag-månad-år. Öppnad förpackning bör förslutas väl och förbrukas inom två veckor.

## INGREDIENSER

Torkad glukossirap, raffinerat vegetabiliskt fett (solrosolja med hög andel oljesyra, soja-, icke hydrerad kokos- raps- och solrosolja, prebiotikablandning (galakto-oligosackarider (GOS) (från **mjolk**), frukto-oligosackarider (FOS)), L-arginin-L-aspartat, L-leucin, laktos (från **mjolk**), L-lysinacetat, glukos (från **mjolk**), L-tyrosin, L-glutamin, L-prolin, trikalciumfosfat, L-valin, emulgeringsmedel (E472c), glycin, L-isoleucin, L-treonin, L-serin, L-histidin, L-alanin, kaliumklorid, trikaliumcitrat, dinatriumvätefosfat, L-cystin, vegetabilisk encellsolja med hög halt arakidonsyra, L-tryptofan, kolinbitartrat, L-metionin, magnesiumacetat, magnesium-L-aspartat, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosaheksaensyra, natriumklorid, M-inositol, L-askorbinsyra, galaktos (från **mjolk**), järnsulfat, taurin, zinksulfat, L-karnitin, DL-a-tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, nikotinamid, antioxidanter (E304, E306, E307), mangansulfat, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, retinylacetat, kaliumjodid, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, vitamin K<sub>1</sub>, natriumselenit, natriummodybdad, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

PKU Anamix Infant är förskrivningsbar på livsmedelsanvisning för barn under 16 år.

Näringsvärde		per 100 g	Per 100 ml 15% spädning
<b>Energi</b>	Kcal	466	70
	kJ	1950	293
<b>Fett (44 E%)</b>	g	23	3,5
mättat	g	7,5	1,1
enkelomättat	g	9,4	1,4
fleromättat	g	5	0,75
linolsyra	g	4,1	0,62
α-linolensyra	g	0,66	0,1
Arakidonsyra (AA)	mg	140	20
Dokosaheksaensyra (DHA)	mg	70	10
Förhållandet n6:n3	5,9:1		
<b>Kolhydrat (43 E%)</b>	g	49,8	7,5
varav sockerarter	g	7,3	1,1
<b>Kostfiber (2 E%)</b>	g	3,7	0,56
<b>Proteinekvalenter (11 E%)</b>	g	13,1	2
<b>Salt</b>	g	0,5	0,07
<b>Aminosyror</b>			
L-alanin	g	0,61	
L-arginin	g	1,08	
L-asparaginsyra	g	1,01	
L-cystin	g	0,4	
L-glutamin	g	1,4	
Glycin	g	0,95	
L-histidin	g	0,62	
L-isoleucin	g	0,95	
L-leucin	g	1,63	
L-lysin	g	1,11	
L-metionin	g	0,26	
L-fenylalanin	g	–	
L-prolin	g	1,16	
L-serin	g	0,71	
L-treonin	g	0,8	
L-tryptofan	g	0,32	
L-tyrosin	g	1,44	
L-valin	g	1,04	
<b>Mineraler</b>			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,3)	28,7 (1,2)
Kalium	mg (mmol)	501 (12,8)	75,2 (1,9)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,1)	53,3 (1,5)
Kalcium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,5)
Fosfor	mg (mmol)	300 (9,7)	45 (1,5)
Magnesium	mg (mmol)	58 (2,4)	8,7 (0,36)
Kalcium/Fosfor ratio	1,4:1		
Järn	mg	8,1	1,2
Zink	mg	5,7	0,86
Koppar	mg	0,43	0,065
Mangan	mg	0,43	0,065
Molybden	µg	12	1,8
Selen	µg	15,5	2,3
Krom	µg	13,8	2,1
Jod	µg	83	12,5
<b>Vitaminer</b>			
Vitamin A	µg-RE	392	58,8
Vitamin D	µg	8,7	1,3
Vitamin E	mg a-TE	4,6	0,69
Vitamin C	mg	49	7,4
Vitamin K	µg	37,2	5,6
Tiamin	mg	0,5	0,08
Riboflavin	mg	0,5	0,08
Niacin	mg-NE	7,5	1,1
Pantotensyra	mg	2,8	0,42
Vitamin B6	mg	0,5	0,08
Folsyra	µg	55	8,3
Vitamin B12	µg	1,2	0,18
Biotin	µg	18,2	2,7
<b>Övriga näringsämnen</b>			
Karnitin	mg	10,1	1,5
Kolin	mg	91	13,7
Inositol	mg	98	14,7
Taurin	mg	23	3,5
Osmolalitet (15% spädning)	mOsmol/kg H <sub>2</sub> O		380

PKU Anamix Infant kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [www.nutricia.se/order](http://www.nutricia.se/order), e-post: [order@nutricia.se](mailto:order@nutricia.se) telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

PKU Anamix Infant	Bestnr: 26 71 04	Förpackning: 400 g
-------------------	------------------	--------------------